

6.2 Elenco dei cacciatori abilitati che sono ammessi al prelievo

Nella tabella seguente sono elencati 61 cacciatori che hanno svolto l'attività di monitoraggio estivo nel mese di agosto 2026 e che per questo motivo sono ammessi al prelievo della specie.

Tabella 21 – Cacciatori abilitati che sono ammessi al prelievo.

Cognome e Nome	
Albani	Mirco
Albertini	Mirko
Alessandrini	Leonardo
Angelini	Jonathan
Bacchiocchi	Aldemiro
Bacchiocchi	Alfio
Cagnucci	Gianluca
Campugiani	Sandro
Cappa	Marco
Capponi	Alverio
Caprodossi	Sergio
Carassai	Athos
Carducci	Paolo
Cecchetti	Sergio
Cipriani	Riccardo
Cristofanelli	Giancarlo
Curi	Maicol
Del Bianco	Carlo
Di Clementi	Weiner
Filipponi	Valentino
Freddi	Fabio
Galassi	Paride
Ilari	Nazzareno
Innocenzi	Andrea
Lorenzi	Andrea
Mancinelli	Graziano
Marzialetti	Maurizio
Mercuri	Alessandro
Miconi	Giuseppe
Miliucci	Marco
Mocchegiani	Carlo
Mogliani	Erik
Nicolini	Cesare
Nicolini	Diego
Ortolani	Matteo
Pacioni	Alessandro
Pacioni	Sandro
Palmarucci	Marcello
Panniccia'	Renzo
Pasquali	Daniele
Patacchini	Mariano
Pergolesi	Ivano
Pergolesi	Alessandro

Perticarini	Mario
Petrucchi	Raffaele
Piergentili	Giacomino
Piergentili	Carlo
Recanatini	Francesco
Remigi	Marzio
Romagnoli	Riccardo
Saltarelli	Gianluca
Salustri	Giorgio
Salvi	Matteo
Scarpetta	Giorgio
Socci	Franco
Tanfani	Samuele
Verdolini	Roberto
Vita	Milco
Vitanzi	Angelo
Zamparini	Lorenzo
Zeppa	Roberto

7. Piano di prelievo

In base al Piano di Gestione Nazionale (2017) il prelievo della coturnice può essere autorizzato quando:

- la densità delle coppie riproduttive in un DG-coturnice è superiore a 1 ind/kmq;
- il rapporto J/AD ottenuto con il censimento riproduttivo è superiore a zero in un DG-coturnice;

Il piano di prelievo che si ritiene opportuno proporre tiene conto delle seguenti considerazioni:

- le aree di monitoraggio individuate sono risultate rappresentative del DG di appartenenza;
- la selezione delle aree di monitoraggio all'interno di ciascun DG è stato casuale;
- l'ampiezza del campione è superiore al 25% della SU di ciascun DG-coturnice;

Il numero degli animali da prelevare ogni anno va stabilito in base alla densità stimata all'interno di ciascun DG-coturnice, tenendo conto del rapporto giovani/adulti secondo le seguenti fasce di prelievo:

- 0 - 5% nei DG-coturnice con un SR < 1;
- < 15% nei DG-coturnice con un SR compreso fra 1 e 2
- < 20% nei DG-coturnice con un SR maggiore di 2;

Nella redazione del piano di prelievo si è tenuto conto anche dell'andamento triennale del carnere annuo che individua una media di c.a. 5 capi annui di coturnice abbattuti nell'ultimo quinquennio.